

WEINBAUEMPFEHLUNG | 22/23 KW

Weiterhin hohe Oidium-Indexwerte!

Blühbeginn in frühen Lagen erwartet!

Mit den wärmeren Temperaturen nimmt die Rebentwicklung jetzt deutlich an Fahrt auf. Die Blüte rückt mit raschen Schritten näher. Zum Wochenende wird wechselhaftes Wetter mit Schauern und örtlichen Gewittern angekündigt. Der starke Zuwachs, verbunden mit dann schwierigen Applikationsbedingungen führt schnell zu Lücken im Pflanzenschutz. Bis zur Blüte stehen je nach Entwicklung und Spritzintervall noch ein bis zwei Behandlungen an. Spritzabstände nicht ausreizen!

Peronospora:

Die angekündigten Wetterbedingungen könnten am Wochenende wieder zu Infektionen führen. Für mehr Sicherheit sollten Fungizide mit Zuwachsschutz e Das Wetter der letzten Tage hat verbreitet leichte Niederschläge gebracht. Das Rebwachstum hat durch das warme Wetter wieder Fahrt aufgenommen. Die Blüte wird in den kommenden Tagen erwartet. In frühen Lagen, bei frühen Sorten fallen sogar schon erste Käppchen. Lagen- und Sortenweise gibt es allerdings große Unterschiede. Das Wetter soll zunächst trocken bleiben. Die Reben kommen jetzt in ihre empfindlichste Phase, diese Behandlung wird die letzte Vorblütebehandlung sein.

Oidium:

Die Oidium-Indexwerte bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Vor allem in gefährdeten Lagen und bei empfindlichen Sorten dürfen die Spritzabstände nicht zu lange gezogen werden. Wir befinden uns jetzt im Oidiumfenster! Achten Sie auf Ihr Resistenzmanagement und verwenden Sie nur Oidiumfungizide der höchsten Schutzklassen. Produkte der Wirkstoffgruppe L (Sercadis, Luna Max, Luna Exp., Collis) sollten erst für die abgehende Blüte-Spritzung eingeplant werden.

Ihr Ansprechpartner:

Dominik Born

+49(6341)63895 | Dominik.Born@rws-suedpfalz.de

Traubenauflockernde Maßnahmen:

Neben der Teilentblätterung kurz nach der Blüte, hat auch der Einsatz von Wachstumsregulatoren einen deutlichen Einfluss auf den Ertrag. Der Biegeindex wird positiv beeinflusst und somit auch Botrytis vorgebeugt.

Wachstumsregulatoren entfalten ihre Wirkung nur zur Vollblüte. Die Sortenempfehlungen und Hinweise zu Aufwandmengen müssen unbedingt beachtet werden!

Regalis plus (zugelassen in allen Sorten)

Berelex 40 SG (Burgundersorten und Portugieser)

Mit 300-400 l/ha **nur Traubenzone**, auf gute Benetzung achten!

Auch der Blattdünger **SprintAlga** zeigte in vielen Versuchen einen auflockernden Effekt auf das Stielgerüst.

Für einen optimalen Effekt bereits vor der Blüte und dann erst bei der ersten Nachblütespritzung der Spritzbrühe zusetzen. Behandlung der kompletten Laubwand! Phosphonate können die Wirkung verstärken!

Produktempfehlung letzte Vorblütenspritzung

Mittelberechnung

2 x Basisaufwand (ab BBCH 61)

Empfohlene Wasseraufwandmenge:

200 - 250 l/ha

Oidium:

Dynali: 0,4l/ha

Peronospora:

Profiler: 1,5 kg/ha (als letztes der Spritzbrühe zugeben!)

(Die Produktempfehlungen der RWZ-Weinbauaufrufe berücksichtigen das Anti-Resistenzmanagement.)